



SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

BLATTOXUR GEL

Registrazione del Ministero della Salute n. 19546

ESCA INSETTICIDA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARAFAGGI - USO DOMESTICO E CIVILE -

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Acetamiprid	2 g
Sostanze appetenti e adescanti	q.b. a 100 g

Caratteristiche

BLATTOXUR GEL è un esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa*, *Polyphaga aegyptiaca*). Il gel è efficace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine. Contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neonicotinoidi; il prodotto agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico.

BLATTOXUR GEL combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida.

Attrattività: il prodotto contiene sostanze alimentari e additivi che attraggono gli insetti fino ad un metro di distanza.

Palatabilità: le sostanze alimentari contenute stimolano il processo di alimentazione delle blatte. Ciò garantisce l'assunzione di dosi letali di sostanza attiva.

Efficacia: prove pratiche d'uso hanno dimostrato che si ottiene l'eliminazione dell'intera popolazione di blatte dopo circa 5 o 6 giorni dall'applicazione.

BLATTOXUR GEL è stabile ed attivo per molte settimane dopo l'applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e non si secca.

Campo di applicazione

Il gel è efficace su tutte le specie di blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine.

Dosi e modalità di impiego

Applicare gocce di prodotto della grandezza di una lenticchia in fessure, crepe murali, sui battiscopa, sulle scatole elettriche, sulle condutture dell'acqua e in tutti gli anfratti bui, umidi e caldi dove le condizioni ambientali favoriscono il proliferare delle blatte.

Come trattamento preventivo o in presenza solo di *Blattella germanica* utilizzare le dosi di seguito riportate:

- cucina o altri luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 2/3 gocce m²
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/3 gocce m²
- altri ambienti: 1/2 gocce ogni 10-15 m²

Come trattamento curativo o in caso di presenza anche di *Blatta orientalis*:

- cucina o altri luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 4/6 gocce m²
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/4 gocce m²
- altri ambienti: 2/4 gocce ogni 10-15 m²

Si consiglia di non applicare il prodotto su superfici che vengono frequentemente pulite.

Confezioni

Siringhe da 30 g (in scatole da 6 siringhe)

COD 1-99-09-30