



## SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

# BRODI FAST PASTA

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 18991

### ESCA TOPICIDA PRONTA ALL'USO USO DOMESTICO E CIVILE FORMULAZIONE: PASTA FRESCA

#### Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Brodifacoum puro	0,005 g
Denatonio Benzoato	0,001 g
Sostanze appetenti e adescanti	q.b. a 100 g

#### **Caratteristiche**

BRODI FAST PASTA é in formulazione di pasta fresca in bustine da 10-20 grammi e viene impiegato per la lotta contro diversi tipi di roditori come: topolini domestici, arvicole, ratti neri, ratti di fogna, ecc., il formulato è efficace anche contro roditori "resistenti" ad altri topicidi tradizionali. Il roditore una volta ingerito il formulato muore per emorragia interna nel giro di qualche giorno, senza pertanto destare allarme nei consimili verso l'esca: ciò permette una completa derattizzazione. Topi e ratti intossicati, anche con una sola ingestione, presi da senso di soffocamento, tendono ad andare a morire all'aperto.

BRODI FAST PASTA viene impiegato nei seguenti luoghi: abitazioni, giardini, stalle agricole, deposito di rifiuti, fognature, scoli, canali, caserme, stive di navi, vagoni per il trasporto di materiale, container, magazzini, depositi in genere.

BRODI FAST PASTA contiene, per ragioni di maggior sicurezza, il Denatonio Benzoato che conferisce al formulato un sapore estremamente amaro rendendolo quindi immangiabile in caso d'ingestione accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio.

#### **Campo d'applicazione**

BRODI FAST PASTA viene impiegato per la lotta contro diversi tipi di roditori come: topolini domestici, arvicole, ratti neri, ratti di fogna, ecc., il formulato è efficace anche contro roditori "resistenti" ad altri topicidi tradizionali.

#### **Modalità e dosi d'uso**

##### **Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento.**

Impiegare le esche di BRODI FAST PASTA tal quali ponendole all'interno di un appropriato contenitore in quantità pari a 30-50 g nei luoghi frequentati dai roditori. Rinnovare l'esca consumata fino alla totale scomparsa di topi e ratti.

Si raccomanda di non toccare le esche con le mani nude sia per ragioni igieniche sia per il fatto che i roditori diffidano dell'odore dell'uomo. I roditori morti devono essere rimossi dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti e le carcasse non devono essere gettate nei rifiuti o nelle discariche ma smaltite in modo sicuro.

#### **Confezioni**

- Buste da 200 g in scatole da 40 pezzi
- Buste da 500 g in scatole da 40 pezzi

COD 2-15-100-200  
COD 2-15-100-500