

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Registrazione del Ministero della Salute n. 19975

## INSETTICIDA/ACARICIDA IN EMULSIONE CONCENTRATA PER USO DOMESTICO, CIVILE E ZOOTECNICO

### Composizione

100 grammi di prodotto contengono:  
Acetamiprid tec. 5 g (50 g/l)  
d-Tetrametrina tec. 2,5 g (25 g/l)  
Piperonilbutossido tec. 10 g (100 g/l)  
Coformulanti q.b. a 100 g

### Caratteristiche

DOBOL 50:25 EC è una emulsione insetticida/acaricida concentrata che esplica la sua azione per ingestione e contatto per il controllo di scarafaggi, formiche, acari della polvere, tignole delle derrate alimentari, tarme, pulci, cimici dei letti, acari rossi dei polli, tenebrione, mosche, zanzare, zanzara tigre, vespe, calabroni, vespa velutina.

In DOBOL 50:25 EC l'associazione dei 3 principi attivi, Acetamiprid, Tetrametrina e Piperonilbutossido, coniuga l'effetto abbattente (l'effetto biocida inizia nei minuti successivi all'applicazione) e la persistenza (azione del prodotto fino a 90 giorni in condizioni normali di utilizzo) per una maggiore efficacia. L'utilizzo di tre principi attivi di differenti famiglie chimiche minimizza i problemi di resistenza.

### Campo d'impiego

Industria alimentare: ristoranti, alberghi, mense, locali di lavorazione e servizio di prodotti alimentari, mulini, mattatoi, caseifici, latterie, locali di stagionatura e conservazione di salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari e silos vuoti.

Enti e comunità: esercizi pubblici, ospedali, cliniche, case di riposo, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in genere.

Settore industriale: magazzini, locali destinati alla lavorazione ed allo stivaggio del tabacco purché vuoti, lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere, ecc.

Settore trasporti: mezzi di trasporto (metropolitane, automobili, autoambulanze, autobus, navi, carrozze ferroviarie).

Ambienti zootecnici: allevamenti, stalle, ricoveri di animali, canili, maneggi, ecc.

Settore domestico: cucce fisse e da viaggio, abitazioni, condomini, cantine, ambienti frequentati da animali domestici in generale, ecc.

Settore civile: viali, parchi e giardini, aree suburbane, campeggi, villaggi turistici, aree portuali e aeroportuali ecc.

Il prodotto può essere efficacemente impiegato per il controllo delle zanzare nel trattamento delle aree verdi quali siepi, giardini, viali alberati, cespugli ornamentali e tappeti erbosi.

### Dosi e modalità di impiego

DOBOL 50:25 EC si impiega a mezzo ordinari nebulizzatori, pompe manuali a pressione, atomizzatori a motore secondo le dosi e le modalità indicate:

Contro gli scarafaggi e tutti gli insetti striscianti ed acari in generale: 200 ml in 5 litri d'acqua; la soluzione ottenuta è indicata per 100 m<sup>2</sup>. Arieggiare e pulire le superfici da trattare ed effettuare il trattamento. Applicare su superfici verticali fino a 1 m di altezza, intorno a porte fessure e crepe, dentro gli armadi, sotto i mobili, su tende e moquette ecc.

# DOBOL 50:25 EC

REV 01/2018

**Contro gli acari rossi dei polli e tenebrioni:** 200 ml in 5 litri d'acqua; la soluzione ottenuta è indicata per 100 m<sup>2</sup>. Arieggiare e pulire le superfici da trattare ed effettuare il trattamento ed in seguito riscaldare di nuovo l'ambiente. Applicare su pareti, fessure e crepe, gabbie e nastri trasportatori.

**Contro mosche, zanzare (inclusa zanzara tigre) e altri insetti volanti:** 200 ml in 5 litri d'acqua; la soluzione ottenuta è indicata per 100 m<sup>2</sup>. Applicare il prodotto sulle superfici in cui stazionano gli insetti, attorno a porte, finestre e sui pilastri. Contro le vespe, calabroni e vespa velutina, distribuire la soluzione sopra e nei pressi dei nidi avendo cura di effettuare l'applicazione nelle ore in cui le vespe stazionano negli stessi. Nei trattamenti al verde per il controllo delle zanzare effettuare un'accurata bagnatura evitando il gocciolamento.

Il prodotto rimane efficace fino a 90 giorni dopo il trattamento. In caso di necessità ed in ambienti polverosi/sporchi o soggetti a dilavamento applicare il prodotto con maggiore frequenza. Una volta effettuato il trattamento, per ottenere la massima efficacia, evitare di pulire le superfici trattate.

**Precauzioni d'uso:** nell'effettuare trattamenti in ambienti zootecnici, ricoveri di animali o cucce allontanare gli animali durante l'intera durata del trattamento ed attendere che la soluzione si sia asciugata sulle superfici prima di reintrodurli nell'area. Non utilizzare il prodotto su uova o animali. Coprire abbeveratoi, mangiatoie ed in generale contenitori contenenti acqua prima dell'applicazione. Nei trattamenti nell'industria alimentare o comunque nei luoghi dove possono essere preparati alimenti, assicurarsi che non siano presenti derrate o prodotti alimentari a meno che non siano sigillati o protetti da possibile irrorazione. In caso di impiego su materiali soggetti a macchiarsi (moquette, tende, tessuti, materiali laccati o verniciati) verificare gli eventuali effetti del prodotto in una zona non visibile.

Articolo	Codice	Confezione
Dobol 50:25 EC	1-1374-1X6	Flacone da 1 litro in scatola da 6 pz