

Prodotto biocida (PT18): Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2023/00883/BBP

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE CONTRO INSETTI STRISCIANTI E ZANZARA TIGRE

Composizione

100 g di prodotto contengono:	
Cipermetrina (CAS: 52315-07-8)	10.53 g
DPM (CAS 34590-94-8)	54.47 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

ISTRUZIONI PER L'USO E AVVERTENZE

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite. Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto (p.es guanti in nitrile categoria III, EN 374). Deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN 13034).

Applicazione a spot in ambienti chiusi contro insetti striscianti.

Applicazione a spot in ambiente chiuso tramite trattamento a spruzzo contro gli adulti di *Blattella germanica* (blatta germanica), *Blatta orientalis* (blatta orientale), *Lasius niger* (formica nera).

Per trattare superfici porose utilizzare 10 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (1%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore in ragione di 50 mL di soluzione per 1 m² equivalente a 52.7 mg di sostanza attiva per m². Per trattare superfici non porose utilizzare 5 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,5%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore in ragione di 40 mL di soluzione per 1 m² equivalente a 21 mg di sostanza attiva per m². Residualità: 4 settimane. Il trattamento può essere eseguito fino a 2 volte all'anno.

Il prodotto deve essere applicato solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, dove solitamente si nascondono gli insetti. Non applicare su aree soggette a normale pulizia a umido. Evitare il contatto con le superfici trattate.

Applicazione in crepe e fessure in ambienti chiusi contro insetti striscianti.

Applicazione in crepe e fessure in ambiente chiuso tramite trattamento a spruzzo contro gli adulti di *Blattella germanica* (blatta germanica), *Blatta orientalis* (blatta orientale), *Lasius niger* (formica nera).

Nel caso di superfici porose (es. cemento, mattoni, legno plastica ecc.): utilizzare 10 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (1%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore in ragione di 50 mL di soluzione per 1 m² equivalente a 52.7 mg di sostanza attiva per m². Nel caso di superfici non porose (es. plastica, metallo, ceramica ecc.): utilizzare 5 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,5%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore in ragione di 40 mL di soluzione per 1 m² equivalente a 21 mg di sostanza attiva per m². Residualità: 4 settimane. Il trattamento può essere eseguito fino a 2 volte all'anno.

Applicare in crepe e fessure di superfici quali: piastrelle di ceramica, marmo, granito e altre superfici in pietra dura, metalli (acciaio, ferro, ecc...), plastica, vetro (es: vetri delle finestre), compensato verniciato. Applicare il prodotto direttamente in crepe e fessure da una distanza di 40 cm.

Il prodotto deve essere applicato solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, in tutte le crepe e fessure dove solitamente si nascondono gli insetti.

Non applicare su aree soggette a normale pulizia a umido.

Evitare il contatto con le superfici trattate.

Trattamento residuale superficiale intorno agli edifici contro la zanzara tigre

Il prodotto viene applicato all'aperto intorno agli edifici nelle aree rurali per controllare gli adulti di *Aedes albopictus* (zanzara tigre) con applicazione a spruzzo per trattamenti superficiali. Trattare intorno all'edificio partendo da un'altezza di circa 50 cm, fino a 150 cm, trattando una fascia di circa un metro di altezza. Utilizzare 2 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,2%); miscelare accuratamente e, utilizzando una pompa a spalla o un apposito dispositivo, applicare 50 mL di soluzione insetticida per 1 m² equivalente a 10,5 mg di sostanza attiva per m². L'azione residuale del prodotto è di 3 giorni. Il trattamento può essere eseguito fino a 2 volte all'anno.

Il prodotto va applicato uniformemente sull'area prescelta da una distanza di 50 cm. Il prodotto agisce contro le zanzare tigre per contatto e vapore.

Non applicare il prodotto su zone allacciate o in prossimità di fognature, scarichi idrici, tombini. Non applicare in caso di pioggia o vento. Prevenire l'esposizione di organismi non bersaglio (ad esempio, considerare l'applicazione notturna quando gli impollinatori comprese le api non sono attivi, nessun trattamento delle piante durante il periodo di fioritura).

Eradicazione dei nidi di formiche

Il prodotto si applica all'esterno, a spruzzo, per l'eradicazione dei formicai. È efficace contro gli adulti di *Lasius niger* (formica nera).

Il trattamento va effettuato intorno e all'ingresso del nido, a spruzzo per l'eradicazione del nido stesso.

Il prodotto concentrato deve essere diluito in acqua allo 0,5% p/p prima dell'uso. La quantità di soluzione insetticida (diluita) da applicare a ciascun nido è di 25 g/nido equivalente a 13,2 mg di sostanza attiva per nido.

Diluire il prodotto in acqua alla dose consigliata, miscelare accuratamente ed applicare con apposito nebulizzatore per distribuire la soluzione. Per ottimizzare l'efficacia del trattamento non applicare in caso di pioggia o vento.

Trattamento di un solo nido per applicazione.

Articolo	Codice	Confezione
Cipex 10 E	1-30-20X500-BIO	Flacone da 500 ml in scatola da 20 pz
Cipex 10 E	1-30-13-1X12-BIO	Flacone da 1 l in scatola da 12 pz
Cipex 10 E	1-30-13-5-BIO	Tanica da 5 l
Cipex 10 E	1-30-13-1X10-BIO	Tanica da 10 l