

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)  
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2022/00832/MRP

**Insetticida pronto all'uso in microgranuli**  
**CATEGORIA DI UTILIZZATORE: PROFESSIONALE ADDESTRATO –**  
**PROFESSIONALE – NON PROFESSIONALE**  
**AREA DI UTILIZZO: IN AMBIENTI CHIUSI**

### Composizione

100 g di prodotto contengono:

Permetrina (CAS: 52645-53-1) pura	0.50 g
Piperonil butossido (CAS: 51-03-6) puro	0.05 g
Coformulanti q.b. a	100 g

### Organismi target

Blatte (*Periplaneta americana*), zecche (*Ixodes ricinus*), formiche (*Lasius niger*), adulte.

### Istruzioni per l'uso e dosaggio

Il prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi, in aree soggette a restrizione "rigorosamente SENZA pulizia a umido".

Da utilizzare su superfici porose e non porose. Metodo di applicazione: a diffusione.

Trattamento su blatte: applicare sulle superfici interne (su una striscia perimetrale), anche su crepe e fessure, contro la blatta americana (*Periplaneta americana*) spargendo il prodotto direttamente dalla confezione o tramite il diffusore in modo uniforme.

Dosaggio: 10 g prodotto/m<sup>2</sup>. Frequenza di applicazione: una volta al mese. Il prodotto ha un effetto residuo di 3 settimane.

Trattamento su zecche: applicazioni perimetrali in ambienti interni contro le zecche (*Ixodes ricinus*) spargendo il prodotto direttamente dalla confezione o tramite il diffusore in modo uniforme sulle superfici nelle parti perimetrali della stanza. Dosaggio: 12 g prodotto/m<sup>2</sup>. Frequenza di applicazione: una volta al mese. Il prodotto ha un effetto residuo di 3 settimane.

Il prodotto non deve essere utilizzato in presenza di persone o animali (animali domestici). Le persone e gli animali domestici possono rientrare nell'area sottoposta a trattamento dopo 24 ore dall'applicazione del prodotto.

I locali/la stanza sottoposti a trattamento non devono essere resi accessibili agli animali domestici.

Trattamento su formiche: applicazioni nelle parti perimetrali su crepe e fessure contro le formiche nere (*Lasius niger*) spargendo il prodotto direttamente dalla confezione o tramite il diffusore in modo uniforme in particolare nei punti in cui le formiche entrano nell'edificio.

Dosaggio: 10 g prodotto/m<sup>2</sup>. Frequenza di applicazione: una volta al mese. Il prodotto ha un effetto residuo di 3 settimane.

In tutte le tipologie di trattamento:

Non collocare alimenti o mangimi nelle aree in cui il prodotto è o sarà applicato.

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione; agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

### Misure di mitigazione del rischio

NON eseguire pulizie a umido. Eseguire una pulizia a secco delle superfici trattate e della parte di pavimento adiacente con aspirapolvere o scopa o utilizzando carta umida. Evitare che il prodotto raggiunga alimenti o mangimi, bevande, contenitori destinati a contenerli o superfici ed utensili che possano entrarne in contatto.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavare accuratamente con acqua e sapone.

Articolo	Codice	Confezione
Neodust	1-30-38-500X20	Barattolo da 500 g in scatola da 20 pz
Neodust	1-30-38-1x20-BIOC	Barattolo da 1 kg in scatola da 20 pz
Neodust	1-30-38-1000x12-BIO	Busta da 1 kg in scatola da 20 pz