MAGGOTS GR

REV 00/2025

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione del Ministero della Salute n. 20204

INSETTICIDA IN GRANULI SOLUBILI PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI MOSCHE, MOSCONI E TAFANI CHE INFESTANO ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ED AMBIENTI CIVILI

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Ciromazina pura (CAS: 66215-27-8)	g 2
Coformulanti	q.b. a g 100

MAGGOTS GR è un insetticida in granuli solubili a base di ciromazina, insetticida regolatore della crescita specifico per il controllo delle larve di tutte le specie di mosche. La sua modalità d'azione si esplica interferendo sul ciclo biologico della mosca e provocando di conseguenza la morte delle larve. MAGGOTS GR agisce unicamente sulle larve delle mosche e non sulle forme adulte, quindi deve essere impiegato esclusivamente nei luoghi di possibile riproduzione. Non è inteso per l'applicazione su (pareti, soffitti, ecc), in quanto non ha alcun effetto sulle mosche adulte.

Campi di applicazione

L'impiego di MAGGOTS GR è previsto in tutti gli ambienti zootecnici (stalle, porcilaie, pollai, allevamenti in genere) normalmente frequentati dagli insetti, avendo cura di applicarlo nei luoghi di possibile riproduzione delle mosche (ad es. letamaie, concimaie, lettiere permanenti, depositi di materiali organici). MAGGOTS GR può efficacemente essere impiegato anche in altri luoghi ove esistano substrati idonei allo sviluppo larvale delle mosche (discariche, depositi di scarti alimentari o di lavorazione dei pellami, mezzi destinati alla raccolta o al trasporto di rifiuti urbani). Per uso professionale.

Allevamenti Bovini

Lettiera: Applicare il prodotto trattando i bordi e le aree intorno alle mangiatoie, abbeveratoi e dove si accumulano le deiezioni. Nelle aree di riposo poste all'esterno, trattare l'intero corpo di superficie. Applicare MAGGOTS GR bagnando o spruzzando 3 giorni dopo la rimozione delle deiezioni e ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca.

Pavimento grigliato: Trattare tutta la superficie subito dopo la pulizia della fossa del letame, ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca.

Allevamenti Suini

Sistema tutto dentro-tutto fuori: Applicare MAGGOTS GR preferibilmente spargendolo subito dopo la pulizia e prima dell'installazione dei suini.

Pavimento grigliato: Trattare tutta la superficie subito dopo la pulizia della fossa del letame, ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca.

Lettiera: Applicare MAGGOTS GR bagnando o spruzzando approssimativamente 3 giorni dopo la rimozione del letame e ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca. Trattare tutta la superficie sporca ed i punti umidi intorno a mangiatoie ed abbeveratoi.

Allevamenti di Pollame e specie minori

Applicare MAGGOTS GR bagnando o spruzzando l'intera area contaminata dallo sterco circa una settimana dopo la rimozione del letame. Ripetere il trattamento dopo ogni rimozione o quando si trovano le larve di mosca. Con le medesime modalità MAGGOTS

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

Bleu Line S.r.l. Via Virgilio, 28 Z.I. Villanova · 47122 Forlì (FC) · Italia · **Tel.** +39 0543 754430 · **Fax** +39 0543 754162
E-mail: bleuline@bleuline.it · www.bleuline.it · **Pec:** bleuline@pecbleuline.it - P. IVA 03168170409

MAGGOTS GR

REV 00/2025

GR può essere utilizzato anche in allevamenti di ovini, caprini, conigli, visoni, volpi ed in giardini zoologici.

Dosi e modalità d'uso

Applicazione a secco: applicare MAGGOTS GR direttamente e in modo uniforme sui luoghi di riproduzione delle mosche. Utilizzare l'applicazione a secco solo in caso di letame umido o liquido.

Applicazione a Spruzzo: mescolare bene la quantità di MAGGOTS GR indicata con il corrispondente volume di acqua. Applicare sui luoghi di riproduzione delle mosche con uno spruzzatore a spalla o con un'apparecchiatura automatica a spruzzo.

Applicazione per bagnatura: mescolare bene la quantità di MAGGOTS GR indicata con il corrispondente volume di acqua. Applicare in modo uniforme sui luoghi di riproduzione delle mosche con un annaffiatoio. Importante: MAGGOTS GR ha azione larvicida e si applica solo sui luoghi di riproduzione delle mosche.

Tipo di applicazione	Dose	Area Trattata
A secco	500 g	20 m^2
A spruzzo	500 g/5 l di acqua	20 m^2
Per bagnatura	500 g/15 l di acqua	20 m^2

INTERVALLI DI TRATTAMENTO

L'intervallo di trattamento raccomandato dipende dai sistemi di gestione dell'allevamento e dalle condizioni climatiche. L'intervallo tra i trattamenti può variare da 2-3 settimane fino a diversi mesi. Gli animali posso essere presenti durante le applicazioni. Normalmente sono sufficienti intervalli di 6 settimane.

Ultima applicazione: applicare il prodotto sul letame 21 giorni prima della dispersione su pascoli o terra arabile.

Numero massimo di trattamenti: letame di bovini 6 trattamenti all'anno; letame di suini 3 trattamenti all'anno; letame del pollame: non superare la dose massima di 50 g di prodotto per metro quadrato di letame all'anno.

Articolo	Codice	Confezione
Maggots GR	100481	Secchio da 5 kg

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

Bleu Line S.r.l. Via Virgilio, 28 Z.I. Villanova · 47122 Forlì (FC) · Italia · **Tel.** +39 0543 754430 · **Fax** +39 0543 754162
E-mail: bleuline@bleuline.it · www.bleuline.it · **Pec:** bleuline@pecbleuline.it - P. IVA 03168170409