

PRODOTTO BIOCIDA (PT 14)  
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2016/00342 MRS

## RODENTICIDA DI CONTATTO IN SCHIUMA - PER USO PROFESSIONALE

### Composizione

100 g di prodotto contengono:

Cumatetralil puro (CAS 5836-29-3)	0,4062 g
Denatonium benzoato (Bitrex)	0,005 g
Isotridecanol, ethoxylated	1,800 g
Coformulanti, solventi e propellenti	q. b. a 100 g

### Caratteristiche tecniche

Racumin® SchiumAttiva è un rodenticida anticoagulante in una formula in schiuma che agisce per contatto; i roditori vengono in contatto con la schiuma lungo i loro percorsi imbrattandosi il manto; Racumin® SchiumAttiva aderisce al mantello del roditore e viene successivamente assunta per ingestione.

Racumin® SchiumAttiva è adatto per uso in condizioni di forte umidità, in caso di inefficacia delle esche tradizionali o di scarsa appetibilità da parte dei roditori. Racumin® SchiumAttiva non è un'esca e si utilizza prevalentemente come trattamento complementare all'interno di una strategia di lotta ai roditori: ottimizza e completa il piano di derattizzazione.

#### Spettro d'azione:

Per la lotta contro le infestazioni di Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Topolino domestico (*Mus musculus*).

#### Aree di impiego:

Racumin® SchiumAttiva deve essere usato esclusivamente in zone interne, specialmente nei punti più difficili da trattare (cavità, condotti, intercapedini ed altre aree inaccessibili a bambini, animali domestici ed altre specie non target). Racumin® SchiumAttiva si applica presso le tane, lungo i percorsi ed i possibili punti di passaggio dei roditori (es. fori, crepe dei muri, condotti, intorno a tubazioni, ecc.), mantenendo una distanza di almeno 2 metri da alimenti o mangimi e locali di deposito degli stessi.

### Istruzioni, modalità d'uso e dosi d'impiego

Racumin® SchiumAttiva è pronto all'uso e facile da usare. Prima del trattamento: se necessario portare la confezione a temperatura ambiente. Agitare bene la confezione prima dell'utilizzo. Applicare l'apposita cannuccia alla confezione, posizionarla nel punto da trattare e premere il pulsante erogatore. Evitare di applicare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati.

#### Dosi consigliate:

Racumin® SchiumAttiva si applica alle seguenti dosi:

Ratto: applicare dai 20 ai 30 g di schiuma (per ogni tana/per ogni percorso\*), corrispondente a circa 10 cm di schiuma.

Topo: applicare da 4 a 30 g di schiuma (per ogni tana/per ogni percorso\*), corrispondente a circa 6 cm di schiuma.

\* La dose indicata può essere anche suddivisa in diversi punti di applicazione rispettando la quantità complessiva.

Evitare di chiudere completamente i punti di passaggio dei roditori con la schiuma, ma lasciare una piccola apertura visibile, in modo che i passaggi siano utilizzati comunque dai roditori. Non applicare su superfici soggette a corrosione, prima dell'applicazione si consiglia di testare il prodotto su una piccola parte di superficie. La schiuma è un formulato a base acqua. Non applicare su parti elettriche scoperte o su cavi danneggiati dall'azione dei roditori.

Pulire la schiuma applicata in eccesso utilizzando un panno o della carta. Dopo l'applicazione la valvola e la cannuccia possono essere pulite con acqua se necessario. Segnalare

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le prime misure di soccorso.

Dopo il trattamento:

La schiuma applicata ha una durata di 7/12 giorni a seconda delle condizioni ambientali. Le attività di controllo di topi e ratti devono continuare finché non vi sia più consumo apparente delle esche e comunque non oltre le 6 settimane (il prodotto non è destinato ad un uso permanente). La schiuma deteriorata deve essere rimossa ad ogni controllo. Effettuare operazioni di controllo ad intervalli frequenti per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo la normativa vigente. Le carcasse non vanno gettate nei rifiuti o nelle discariche. Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti. Quando il trattamento è terminato, tutta la schiuma rodenticida deve essere raccolta ed eliminata secondo le leggi vigenti.

Articolo	Codice	Confezione
Racumin® Schiumattiva	2-26-303	Bombola da 500 ml in scatola da 6 pz

# SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie