

## EROGATORI DI FEROMONE PER *STEGOBIUM PANACEUM* (ANOPIO DEL PANE)

### Erogatore

Fialetta in polietilene ad alta densità, colore neutro, dimensioni 45 x 6 mm.

### Principi attivi

(4S,6S,7S)- 4,6-dimetil-7-idrossinonan-3 one C<sub>11</sub>H<sub>22</sub>O<sub>2</sub> [CAS N. 72522-40-8]

### Dose

1 mg / erogatore.

### Rilascio

Non determinato (< 0,5 microgrammi / ora).

### Persistenza d'azione

50-60 giorni senza differenze significative rispetto all'attività iniziale, poi progressivo lento decadimento con effetti residui apprezzabili anche oltre i 90 giorni.

### Attività specifica

Feromone sessuale; attrae i maschi di *Stegobium paniceum* (Linnaeus); manifesta un elevato potere attrattivo anche nei riguardi di *Lasioderma serricornis* (Fabricius)

### Impiego

Come innesco in trappole adesive, usate a scopo di monitoraggio. L'erogatore può essere appeso all'interno della trappola o posato sulla superficie adesiva; in questo caso la colla non deve ricoprire completamente l'erogatore. Viceversa la copertura con polveri o farine, purché in strato incoerente, non pregiudica in modo sensibile l'attività dell'erogatore.

### Confezionamento

Bustine di film accoppiato tristrato carta/alluminio/polietilene chiuse per termosaldatura.

### Conservazione

Gli erogatori chiusi nelle bustine integre possono essere conservati per un anno a temperatura ambiente o per due in frigorifero senza apprezzabile decadimento.

Articolo	Codice	Confezione
Stegobium paniceum	19-72-12-1X10	Confezione da 10 pz