

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)  
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2023/00835/MRS

## ESCA IN GEL (PRONTA ALL'USO) (PT18) UTILIZZATORE PROFESSIONALE ADDESTRATO, PROFESSIONALE

### Composizione

100 g di prodotto contengono:

Dinotefuran:	0,0202%
Isopentyl acetate:	0,005%
Cyclohexane:	0,01%
BIT:	0,001%

### Organismi target

Formica nera dei giardini (*Lasius niger*): tutti gli stadi di sviluppo.

Formica argentina (*Linepithema humile*): tutti gli stadi di sviluppo.

*Monomorium pharaonis* (Pharaon ant): Tutti gli stadi di sviluppo (interno).

### Campo di applicazione

In ambiente chiuso, interno, locali industriali, commerciali o pubblici e area privata, All'aperto, esterno, esterno intorno a case ed edifici, esterno su terrazze.

### Metodi di applicazione

Applicazione esca in gocce di gel.

### Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 0.2 g/m<sup>2</sup>

Trattamento con la siringa o il flacone: applicare le gocce di gel in maniera puntuale o direttamente nelle fessure e nelle crepe dove si nascondono gli insetti, sul percorso delle formiche o vicino al nido.

Applicare 2 gocce da 0,1 g (0,5 cm di diametro) per metro quadrato o lineare.

### Istruzioni d'uso

Leggere sempre l'etichetta o l'opuscolo prima dell'utilizzo e rispettare tutte le istruzioni indicate.

Evitare l'utilizzo continuo del prodotto.

Applicare il prodotto con precisione sulla traccia delle formiche o vicino al nido.

Rispettare le dosi di applicazione del prodotto.

La diminuzione della popolazione può essere osservata 7 giorni dopo l'applicazione, ma la completa eradicazione può richiedere fino a un mese. Le gocce di gel e/o le stazioni esca devono essere controllate 7 giorni dopo la prima applicazione e poi una volta alla settimana.

Rinnovare il gel esca consumato o sporco fino alla completa eradicazione della colonia o un mese dopo l'applicazione se l'infestazione persiste.

Non mescolare con altri prodotti e non applicare su superfici già trattate con un altro biocida.

Proteggere sempre il prodotto da piogge, inondazioni e acque di lavaggio.

Non applicare il prodotto su superfici assorbenti. Non esporre le gocce dell'esca alla luce del sole o al calore (es. radiatore). In caso di reinfestazione, rinnovare l'applicazione.

Rimuovere l'esca alla fine del periodo di trattamento per il successivo smaltimento.

## Misure di mitigazione del rischio

Per uso esterno, applicare questo biocida solo in scatole con esche o in fessure e crepe o direttamente sui nidi di formiche. Proteggere dalle api coprendo, per esempio con un vaso da fiori o una tegola (assicurandosi che le formiche abbiano ancora accesso all'esca).

Non applicare direttamente sopra o in prossimità di alimenti, mangimi o bevande, né su superfici o utensili che potrebbero essere in contatto diretto con alimenti, mangimi, bevande e bestiame.

Evitare l'accesso all'esca da parte di bambini e animali.

Attenersi rigorosamente alle norme di igiene individuale: non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto e lavarsi le mani dopo l'uso. Non applicare mai l'esca in gel per un trattamento preventivo, ma utilizzarla solo in caso di infestazione accertata. All'aperto, non applicare sull'orto.

La presenza di 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, sensibilizzante della pelle che può produrre una reazione allergica. Il prodotto contiene dinotefuran pericoloso per le api.

Articolo	Codice	Confezione
Cipex Gel Formiche	102108	Cartuccia da 30 g in confezione da 4 pz.

# SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie