

Prodotto non soggetto a registrazione come fitosanitario ai sensi del Regolamento 1107/2009 Art. 23

## SOSTANZA DI BASE AD AZIONE FUNGICIDA CONTRO PERONOSPORA, BOLLA, MUFFA E ALTRI FUNGHI IN CONCENTRATO DISPERDIBILE



### Composizione

*Equisetum arvense* L.: di purezza conforme alla Farmacopea Europea.

### Caratteristiche

La sostanza di base *Equisetum Arvense* L. è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2014/462. Il prodotto è un estratto preparato conformemente al documento SANCO/12386/2013– rev. 7 del 20 luglio 2017. Il prodotto è ottenuto dai fusti sterili non interrati di *Equisetum arvense* L., o coda cavallina. Fornisce una azione utile nel controllo delle patologie fungine indicate.

### Dosaggio e applicazione

Agitare prima dell'uso. Applicare ad un massimo di 24 ore per prevenire l'ossidazione del prodotto e contaminazioni microbiche. Sono consigliabili test preliminari. 20-30 ml di questo concentrato disperdibile sono idonei alla preparazione di 10 litri di soluzione per applicazione fogliare.

Coltura	Malattia		Litri di soluzione per 100 m <sup>2</sup>	Applicazione
Melo e pesco	Ticchiolatura	<i>Venturia inequalis</i>	5-10	In primavera, da 2 a 6 applicazioni per via fogliare distanziate di 7 giorni.
	Oidio	<i>Podosphaera leucotricha</i>		
	Bolla	<i>Taphrina deformans</i>		
Vite	Peronospora	<i>Plasmopara viticola</i>	1-3	Da primavera a estate, da 2 a 6 applicazioni per via fogliare distanziate di 7 giorni.
	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>		
Cetriolo	Oidio	<i>Podosphaera xanthii</i>	3	Spruzzatura fogliare o applicazione diretta al suolo. 2 applicazioni distanziate di 3 o 4 giorni.
	Funghi del suolo	<i>Pythium spp.</i>		

Coltura	Malattia		Litri di soluzione per 100 m <sup>2</sup>	Applicazione
Pomodoro	Marciume precoce	<i>Alternaria solani</i>	3	In estate, 2 applicazioni per via fogliare distanziate di 14 giorni.
	Septoria	<i>Septoria Lycopersici</i>		
Fragola e lampone	Muffa grigia	<i>Botrytis cinerea</i>	3	Dalla comparsa delle foglie al secondo raccolto, 2 applicazioni per via fogliare distanziate di 5-14 giorni.
	Oidio	<i>Podosphaera aphanis</i>		
	Peronospora	<i>Phytophthora fragariae</i>		
	Altri funghi	<i>Colletotrichum acutatum</i>		
Patata	Peronospora	<i>Phytophthora infestans</i>	3	Dalla comparsa delle foglie alo sviluppo dei tuberi, da 4 a 8 applicazioni per via fogliare distanziate di 5-14 giorni.
	Marciume nero	<i>Alternaria solani</i>		
	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>		

### Tempo di carenza

Nei soli casi del cetriolo o del pomodoro devono trascorrere 15 giorni dal trattamento alla raccolta.

Articolo	Codice	Confezione
Equisetum arvense L.	39-1.109	Flacone da 1 litro in scatola da 6 pz.

**Prodotto destinato alla libera vendita (esente dagli obblighi che regolano la vendita e l'acquisto e l'utilizzo di fitosanitari ai sensi del Decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" e del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 e s.m.i.).**

# SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie