

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione del Ministero della Salute n. 8387

## INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI DELTAMETRINA E TETRAMETRINA SINERGIZZATI CON PBO PER USO PROFESSIONALE

### Composizione

100 g di prodotto contengono:

Deltametrina pura (CAS N.52918-63-5)	2,5 g
Piperonil Butossido puro (CAS N.51-03-6)	1,0 g
Tetrametrina pura (CAS N. 7696-12-0)	0,2 g
Coformulanti	q.b. a 100,0 g

### Caratteristiche

ZAHMO è un insetticida in sospensione concentrata a base di Deltametrina e Tetrametrina che garantiscono un buon potere snidante ed abbattente ed una lunga persistenza.

Il Piperonil Butossido contenuto nella formula esalta l'effetto abbattente, protegge la Deltametrina dalla degradazione enzimatica e aiuta la sua penetrazione all'interno del corpo dell'insetto. ZAHMO risulta molto indicato per la lotta agli insetti sia volanti, quali la mosca comune e le zanzare (comune e tigre), che striscianti, quali blatte e formiche.

### Campi d'impiego

Con l'impiego di ZAHMO, grazie ai dosaggi contenuti, si ottengono elevati standard di attività in ambiti domestici e civili, quali insediamenti industriali e zootecnici (abitazioni, industrie alimentari, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, mezzi di trasporto (escluso aereo), allevamenti, stalle, ricoveri di animali, cucce, concimaie, depositi di rifiuti).

Il prodotto può essere impiegato in aree verdi urbane, pubbliche e private, qualora necessario, per il controllo delle zanzare. Nel trattare le aree verdi, si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione, evitando il gocciolamento.

ZAHMO può essere distribuito con spruzzatori a mano, pompe a spalla, lance e/o atomizzatori a seconda della necessità di impiego e delle superfici da trattare.

### Dosi e modalità d'impiego

ZAHMO si impiega diluito in acqua alle seguenti dosi:

- **contro insetti volanti** (mosca, zanzara, zanzare tigre, ecc.): diluire 3-5 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,3-0,5%). Con un litro di soluzione ottenuto, trattare 10 mq di superficie.

Per trattamenti su concimaie e simili, elevare la dose a 0,6%.

- **contro insetti striscianti** (blatte, formiche): diluire 5-6 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,5-0,6%); con un litro di soluzione ottenuta trattare 10 mq di superficie.

- **per trattamenti sul verde all'aperto** (giardini, viali alberati, siepi, tappeti erbosi): diluire 5 ml di prodotto in 1 litro d'acqua (0,5%). Distribuire la soluzione ottenuta, utilizzando atomizzatori a medio-basso volume o altre idonee attrezzature in ragione di 100 litri per 10.000 mq di superficie. In relazione all'attrezzatura usata ed alla velocità di trasferimento, le concentrazioni possono essere aumentate, in ogni caso non superare la concentrazione dell'1,5%.

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

**Avvertenze:** nei trattamenti nell'industria alimentare o comunque nei luoghi dove possono essere presenti alimenti, assicurarsi che non siano presenti derrate o prodotti alimentari a meno che non siano sigillati o protetti da possibili irrorazioni. Nell'effettuare trattamenti in ricoveri di animali o cucce allontanare gli animali durante l'intera durata del trattamento ed attendere che la soluzione si sia asciugata sulle superfici prima di reintrodurli nell'area.

Articolo	Codice	Confezione
Zahmo	102293	Flacone da 1 l in scatole da 12 pz.
Zahmo	102294	Tanica da 5 l in scatole da 4 pz

# SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie